

QUANTITES DE MATIERE

3 Calculer un nombre de molécules

| Restituer ses connaissances ; effectuer un calcul.

Une goutte d'eau contient une quantité de matière $n = 2,1 \times 10^{-3}$ mol d'eau.

- Exprimer puis calculer le nombre de molécules d'eau contenues dans la goutte.

5 Calculer une masse molaire ionique

| Mobiliser ses connaissances.

Les ions hydrogénocarbonate HCO_3^- et les ions sodium Na^+ sont présents dans le sang.

1. Pourquoi peut-on considérer que la masse molaire ionique de l'ion sodium Na^+ est égale à la masse molaire atomique du sodium Na ?

2. Exprimer, puis calculer, la masse molaire ionique de l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- .

Données

Élément	H	C	O
$M (\text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$	1,0	12,0	16,0

6 Comparer des quantités de matière

| Faire preuve d'esprit critique.

Les béchers **a** et **b** contiennent respectivement 30,0 g de cuivre et 30,0 g de fer.

- Le bécher contenant la plus grande quantité de matière est-il celui dans lequel le tas de solide est le plus volumineux ? Justifier.



Données

- $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

7 Déterminer une masse molaire moléculaire puis une masse

| Mobiliser ses connaissances.

On prélève une quantité de matière $n = 2,9 \times 10^{-2}$ mol de vanilline, de formule chimique $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$.

1. Calculer la masse molaire moléculaire M de la vanilline.
2. En déduire la masse m de vanilline prélevée.

Données

Élément	H	C	O
$M (\text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$	1,0	12,0	16,0

9 Calculer une quantité de matière à partir d'un volume de liquide

| Restituer ses connaissances ; effectuer un calcul.

Une bouteille contient un volume $V = 1,0 \text{ L}$ d'acétone.

1. Exprimer, puis calculer, la masse m d'acétone contenue dans cette bouteille.

2. En déduire la quantité de matière n correspondante.

Données relatives à l'acétone

- $M = 58,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $\rho = 790 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$.



13 Calculer une concentration en quantité de matière

| Mobiliser ses connaissances ; effectuer des calculs.

Une solution est obtenue en dissolvant une quantité de matière $n = 0,17 \text{ mol}$ de glucose dans de l'eau. Le volume de la solution est $V_{\text{solution}} = 100,0 \text{ mL}$.

1. Exprimer la concentration en quantité de matière de glucose dans cette solution.
2. Calculer sa valeur en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

15 Déterminer une concentration en masse

| Comparer un résultat à une valeur de référence.

Des résultats d'analyses effectuées sur une eau minérale donnent une concentration en ions magnésium égale à $3,1 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Minéralisation caractéristique (mg/L)

Ca^{2+}	Calcium - 468
Mg^{2+}	Magnésium - 74,5
Na^+	Sodium - 9,4
SO_4^{2-}	Sulfate - 1121
HCO_3^-	Bicarbonate - 372

> Étiquette de l'eau minérale

1. Déterminer la concentration en masse des ions magnésium dans l'eau minérale à partir des résultats d'analyses.
2. La concentration en masse déterminée est-elle en accord avec l'indication qui figure sur l'étiquette ?

Donnée


- $M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

19 Calculer la concentration d'une solution fille

| Extraire et exploiter des informations ; effectuer des calculs.

Une solution aqueuse a été préparée en diluant une solution de concentration en diiode $C = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ selon les étapes schématisées ci-dessous.

1. Calculer le facteur de dilution F .
2. En déduire la concentration C' en diiode de la solution diluée.



27 Glycémie à jeun

Extraire et exploiter des informations ; effectuer des calculs.

La concentration en glucose ($C_6H_{12}O_6$) dans le sang, appelée glycémie, permet de diagnostiquer ou de surveiller un diabète. Une glycémie est considérée comme normale si elle est comprise entre $3,5$ et $6,1 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ à jeun. Une personne est diabétique si la valeur de la glycémie est supérieure à $7,0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ à jeun.

1. Calculer la masse molaire du glucose.
2. L'analyse de sang d'un patient indique une glycémie à jeun de $0,96 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$. Ce patient est-il diabétique ?

29 Le dioxyde de carbone dans les boissons

Faire preuve d'esprit critique ; effectuer des calculs.

1. Calculer la quantité n_1 de dioxyde de carbone contenue dans un volume $V = 600 \text{ mL}$ à 20°C et $1\,013 \text{ hPa}$.

2. La recharge d'un gazéificateur de boisson contient 425 g de dioxyde de carbone dans un volume $V = 600 \text{ mL}$.

a. Calculer la masse molaire du dioxyde de carbone CO_2 .

b. En déduire la quantité n_2 de dioxyde de carbone contenue dans cette recharge.

3. Comment est-il possible que la recharge contienne une telle quantité de dioxyde de carbone ?

4. Quand la recharge est considérée comme « vide », que contient-elle ? Justifier.

Données

- Volume molaire d'un gaz à 20°C et $1\,013 \text{ hPa}$: $V_m = 24,0 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- Masses molaires : $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.



30 Solution commerciale d'éosine

Rédiger un protocole.

L'éosine est utilisée comme solution asséchante. Un flacon contient une solution S de concentration en éosine $C_S = 6,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Pour préparer cette solution S , on dispose d'une solution S_0 de concentration $C_0 = 0,24 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en éosine qu'il faut diluer.

1. Calculer le volume V_0 de solution S_0 à prélever pour préparer $V_S = 100,0 \text{ mL}$ de solution S .
2. Rédiger le protocole de la dilution en précisant la verrerie à utiliser.



31 Dilution d'un berlingot d'eau de Javel

Élaborer un protocole.

L'eau de Javel est une solution aqueuse contenant, entre autres, des ions hypochlorite ClO^- . Elle peut être commercialisée en bouteille et en « berlingot ». La notice d'un « berlingot » contenant 250 mL d'eau de Javel indique « verser le berlingot dans une bouteille d'un litre vide et compléter à l'eau froide ».

1. Calculer la concentration en quantité de matière des ions hypochlorite dans la solution préparée.
2. Comparer cette concentration à celle des ions hypochlorite contenus dans une bouteille commerciale d'eau de Javel.
3. Pour utiliser de l'eau de Javel en bouteille lors d'une synthèse, elle doit être diluée 20 fois. Décrire un protocole expérimental permettant d'en préparer un volume $V_S = 50,0 \text{ mL}$.

Données

- Concentrations en ions hypochlorite :
 - $0,46 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans un berlingot ;
 - $0,11 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans une bouteille commerciale.